

TESTS DYNAMIQUES PRELEVES AU LABORATOIRE

NOM DU TEST	INDICATIONS	PRODUIT	PROTOCOLE	DELAI DE RESULTATS
TEST AU SYNACTHENE®	Exploration de la corticosurrénale.	Tétracosactide (Synacthène®, ampoule à 0.25 mg dans 1 ml) <u>Posologie Adulte</u> : 0.25 mg (1 ampoule). A CHERCHER A LA PHARMACIE PAR LE PATIENT	-Patient à jeun depuis 12h et au repos depuis 30 min. -Premier prélèvement T0 à 8h du matin. -Injection IM de la dose appropriée de synacthène. -2 ^e prélèvement T30 à 30 min et T60 à 60 min après l'injection de synacthène.	J0
TEST A LA DEXAMETHASONE® DECTANCYL®	Freinage de la corticosurrénale.	Dexaméthasone (Dectancyl® comprimés à 5 mg) <u>Posologie Adulte</u> : 1mg (2 comprimés de Dectancyl). A CHERCHER A LA PHARMACIE PAR LE PATIENT	-J0 : Premier prélèvement à 8h du matin. -A minuit du J0 prise de 2 comprimés de 5mg de Dectancyl®. -J1 : Deuxième prélèvement le lendemain à 8h du matin.	J+1
O'SULLIVAN HGPO	Dépistage du diabète gestationnel, Dépistage de diabète.	Solution glucosée contenant 75 g de sucre. FOURNI PAR LE LABORATOIRE	-T0 : premier prélèvement le matin après 12h de jeune. -Boire le plus rapidement possible la solution glucosée. -T60 : deuxième prélèvement 1 heure après avoir bu la solution glucosée. -T120 : 3 ^e prélèvement 2h après avoir fini de boire la solution glucosée.	J0
Test respiratoire à l'urée marquée (Helicobacter pylori)	Diagnostic in vivo de l'infection à Helicobacter pylori	HELI-KIT® (TEST INFAL® enfants de 3 à 11 ans). A CHERCHER A LA PHARMACIE PAR LE PATIENT	Sujet à jeun depuis la veille et au repos (sans boire, ni manger, ni fumer depuis au moins 6 heures). Arrêt de tout traitement antibiotique 4 semaines avant le test, des antisécrétoires (IPP, anti H2...) 2 semaines avant le test, des antiacides et pansements gastro intestinaux 24 heures avant le test. -Recueil de 2 tubes d'air après ingestion d'acide citrique. -Puis de 2 tubes d'air expiré 30 min après ingestion d'urée marquée. Le recueil d'air expiré se fait en soufflant doucement au moins 15 secondes dans les tubes fournis dans le kit de prélèvements HELI-KIT®.	J+7 Analyse sous traitée